

УСПІХ, ГАРАНТОВАНИЙ СЕЛЕКЦІЄЮ СЕСВАНДЕРХАВЕ!

КАТАЛОГ ГІБРИДІВ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

SESVANDERHAVE



ІГУАНА
1



МАНІТУ
2



СІУ
3



БАЛІ
4




КАРПАТИ
5



ТАПІР
6

ТОРЕАДОР
7




ФАЙТЕР
8



ХОРНЕТ
9



АНАКОНДА
10




БОА
11



ПАНДА
12





ПІТБУЛЬ
13




АРГУМЕНТ
14




БІЗОН
15



ХАЙЛЕНД
16



ВАПІТІ
17



ЖИРАФ
18

ПРЕДАТОР
19



СКОРПІОН
20



МАГІСТР
21



ТАЛТОС
22



КОЙОТ
23



ФЕДЕРІКА
24



www.sv-ukraine.com.ua

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.
*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ІГУАНА НОВИНКА

SESVANDERHAVE

- **ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ТА ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У БЕЛЬГІЇ, ФРАНЦІЇ, СЕРБІЇ, УКРАЇНІ**

- Стійкість до складних погодних умов (в т.ч. посухи)
- Дуже добра лежкість у кагатах
- Надзвичайно продуктивний
- Висока стійкість до рамулярії
- Вдале поєднання високопродуктивності та стійкості до хвороб коренеплоду і листя
- Дуже стійкий до ризоманії, борошнистої роси та церкоспорозу
- Має чудову толерантність до хвороб коренеплоду



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	**N**	**-**	**8**	**6**	**8**	**7**	**7**	**9**	**2020**	**111**	**21,8**
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

МАНІТУ НОВИНКА

- ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ І СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ



- Посухостійкий
- Дуже добра лежкість у кагатах
- Висока цукристість і чистота соку
- Надзвичайно стійкий до церкоспорозу (9)
- Швидке формування коренеплоду і накопичення цукру
- Толерантний до хвороб листя і коренеплоду
- Технологічний при переробці

СІУ НОВИНКА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В АВСТРІЇ, СЕРБІЇ І УКРАЇНІ

- Посухостійкий
- Надзвичайно продуктивний
- Толерантний до хвороб коренеплоду
- Стійкий до ризоманії, борошнистої роси, рамулярії та церкоспорозу
- Економне водоспоживання гарантує витримувати посуху
- Коренеплоди відповідають вимогам механізованого збирання
- Відмінна сировина для цукрових заводів



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	**Z**	**-**	**8**	**8**	**9**	**6**	**7**	**9**	**2020**	**106**	**23,7**
СІУ	**NZ**	**-**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**9**	**2020**	**108**	**23,5**
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності кореневого коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

БАЛІ НОВИНКА

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ШВЕЦІЇ, НІДЕРЛАНДАХ, УКРАЇНІ



- нематодостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, ризоманії
- середня стійкість до борошнистої роси, рамуляріозу
- дружні сходи
- високий потенціал збору цукру

КАРПАТИ НОВИНКА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, СЛОВАЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	**N**	**9**	**7**	**6**	**8**	**6**	**6**	**9**	**2019**	**105**	**21,4**
КАРПАТИ	**NZ**	**-**	**7**	**8**	**8**	**7**	**6**	**9**	**2019**	**98**	**22,4**
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ТАПІР НОВИНКА

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ



- посухостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, ризоманії
- середня стійкість до рамуляріозу
- висока стійкість до складних погодніх умов
- висока енергія росту рослин

ТОРЕАДОР НОВИНКА

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, СЛОВАЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- високоврожайний



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	**N**	**-**	**7**	**8**	**5**	**6**	**5**	**9**	**2019**	**112**	**21**
ТОРЕАДОР	**N**	**-**	**8**	**8**	**7**	**7**	**5**	**9**	**2019**	**114**	**22**
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності кореноплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

SESVANDERHAVE

ФАЙТЕР НОВИНКА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ




- високооцінений виробничниками Європи
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, ризоманії
- середня стійкість до рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

ХОРНЕТ НОВИНКА

SESVANDERHAVE

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, УКРАЇНІ

- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- швидке змикання рядків
- низький вміст альфа-амінного азоту



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	**NZ**	**-**	**7**	**6**	**8**	**8**	**6**	**9**	**2019**	**96**	**22,4**
ХОРНЕТ	**NZ**	**-**	**8**	**6**	**7**	**7**	**5**	**9**	**2019**	**98**	**24**
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

АНАКОНДА

- ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, УКРАЇНІ



- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

БОА

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий, високооцінений виробничниками Європи
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до ризоктонії
- високопродуктивний



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	**Z**	**-**	**6**	**6**	**8**	**7**	**6**	**9**	**2018**	**99**	**22,6**
БОА	**N**	**-**	**7**	**8**	**6**	**6**	**5**	**9**	**2018**	**102**	**23**
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8


Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності кореневого коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ПАНДА

- **ДИПЛОЇД Z/NZ-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ, НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ**



- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, ризоманії
- середня стійкість до рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- висока оцінка цукроварів

ПІТБУЛЬ

- **ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, НІДЕРЛАНДАХ, УКРАЇНІ**

- нематодостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- дружні сходи
- високий потенціал врожайності на інфікованих нематодою полях



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	**Z/NZ**	**-**	**7**	**7**	**8**	**7**	**5**	**9**	**2018**	**100**	**22,2**
ПІТБУЛЬ	**N**	**9**	**7**	**7**	**8**	**5**	**5**	**9**	**2018**	**103**	**21**
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності кореневого коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

АРГУМЕНТ

- ДИПЛОЇД Z/NZ-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ, НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ



- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- добра лежкість у кагатах
- добрий баланс між урожайністю і стійкістю до церкоспорозу
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- високий потенціал


НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	**Z/NZ**	**-**	**5**	**5**	**8**	**6**	**6**	**9**	**2016**	**100**	**20,8**

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

БІЗОН

- ДИПЛОЇД N/NZ-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У НІДЕРЛАНДАХ, УКРАЇНІ

- нематодостійкий
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал незалежно від ступеню ураження поля буряковою нематодою



НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	**N/NZ**	**9**	**7**	**5**	**6**	**6**	**5**	**9**	**2015**	**101**	**19,7**
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності кореневмоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ХАЙЛЕНД

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ДАНІЇ, СЕРБІЇ, УКРАЇНІ



- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- добра лежкість у кагатах
- кращий гібрид 2015 року
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

ВАПІТІ

- ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ЛИТВІ, УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ




- швидкий ріст коренеплоду у другій половині вегетації
- дуже добра лежкість у кагатах
- толерантний до збудників кореневих гнилей
- висока стійкість до ризоманії, борошнистої роси
- середня стійкість до церкоспорозу, рамуляріозу
- дружні сходи
- сорт стабільний

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	**NZ**	**-**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**9**	**2015**	**106**	**20,4**
ВАПІТІ	**N**	**-**	**6**	**5**	**6**	**9**	**6**	**9**	**2014**	**101**	**19,5**
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ЖИРАФ

- **ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У БЕЛЬГІЇ, ФРАНЦІЇ, ПОЛЬЩІ, ХОРВАТІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ**



- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- коренеплід ширококонічної форми повністю заглиблений у грунт
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

ПРЕДАТОР

- **ДИПЛОЇД N-ТИПУ (УРОЖАЙНИЙ)**
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ**
- **ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У СЛОВАКІЇ, ХОРВАТІЇ, ЧЕХІЇ, УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ**



- високопродуктивний
- добра лежкість у кагатах
- крупний коренеплід повністю заглиблений у грунт, швидке наростання маси у другій половині вегетації
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- сорт стабільний

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	**Z**	**-**	**5**	**7**	**6**	**7**	**6**	**9**	**2014**	**97**	**20,8**
ПРЕДАТОР	**N**	**-**	**5**	**5**	**5**	**7**	**5**	**9**	**2014**	**103**	**19**
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності кореннеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

СКОРПІОН

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У НІДЕРЛАНДАХ, ЧЕХІЇ, БЕЛЬГІЇ, ЛИТВІ, УКРАЇНІ



- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- крупний коренеплід повністю заглиблений у грунт
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- технологічний при переробці , схвалений фермерами Європи
- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

МАГІСТР

- ДИПЛОЇД Z/NZ-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ, НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ ТА СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ



- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- висока енергія росту рослин навіть в умовах холодної весни
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	**NZ**	**-**	**5**	**7**	**6**	**6**	**6**	**9**	**2014**	**99**	**19,6**
МАГІСТР	**Z/NZ**	**-**	**5**	**7**	**7**	**6**	**6**	**9**	**2012**	**106**	**21**
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ТАЛТОС

- ДИПЛОЇД Z-ТИПУ (ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ РАННІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ



- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- кращий для вирощування у стресових умовах
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- стійкий до стеблування
- технологічний при переробці

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

КОЙОТ

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В НІДЕРЛАНДАХ, БЕЛЬГІЇ, НІМЕЧЧИНІ, ІТАЛІЇ, УГОРЩИНІ, ЧЕХІЇ, ТУРЕЧЧИНІ, УКРАЇНІ

- посухостійкий
- добра лежкість у кагатах
- поєднує високу врожайність та цукристість
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- висока енергія росту рослин
- високий потенціал, незалежно від природних зон




НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	**Z**	**-**	**6**	**7**	**7**	**6**	**6**	**9**	**2012**	**99**	**21**
КОЙОТ	**NZ**	**-**	**5**	**7**	**6**	**6**	**6**	**9**	**2010**	**96**	**20**
ФЕДЕРІКА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2009	94	19
БАКАРА	NZ	-	5	5	6	6	6	9	2007	95	18

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту

ФЕДЕРІКА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У ФРАНЦІЇ, УГОРЩИНІ, УКРАЇНІ



- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- добра лежкість у кагатах
- при переробці має високу чистоту соку
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- технологічний при переробці
- високий потенціал

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
ІГУАНА	N	-	8	6	8	7	7	9	2020	111	21,8
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020	106	23,7
СІУ	NZ	-	7	7	7	6	6	9	2020	108	23,5
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019	105	21,4
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019	98	22,4
ТАПІР	N	-	7	8	5	6	5	9	2019	112	21
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	5	9	2019	114	22
ФАЙТЕР	NZ	-	7	6	8	8	6	9	2019	96	22,4
ХОРНЕТ	NZ	-	8	6	7	7	5	9	2019	98	24
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018	99	22,6
БОА	N	-	7	8	6	6	5	9	2018	102	23
ПАНДА	Z/NZ	-	7	7	8	7	5	9	2018	100	22,2
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	5	5	9	2018	103	21
АРГУМЕНТ	Z/NZ	-	5	5	8	6	6	9	2016	100	20,8

Z – гібриди цукристого напрямку, рекомендуються для ранньої копки;
N – гібриди врожайно-нормального типу, рекомендуються для пізньої копки;
NZ – гібриди нормально-цукристі, рекомендуються для середньої та пізньої копки;
1-9: оцінка стійкості, де **9** – це найбільша стійкість.

БАКАРА

- ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ (НОРМАЛЬНО-ЦУКРИСТИЙ)
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ СЕРЕДНІХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
- ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У БЕЛЬГІЇ, ФРАНЦІЇ, УКРАЇНІ



- високопродуктивний по масі коренеплоду та цукру
- добра лежкість у кагатах
- затребуваний та перевірений часом
- висока стійкість до ризоманії
- середня стійкість до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу
- сорт стабільний, не вибагливий до умов росту
- високий потенціал, стандарт у сортовипробуванні

НАЗВА ГІБРИДУ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен.гнилей	стійкість до посухи	стійкість до церкоспорозу	стійкість до борошн.роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації	потенціал по * врожайності т/га	потенціал по ** цукристості %
БІЗОН	N/NZ	9	7	5	6	6	5	9	2015	101	19,7
ХАЙЛЕНД	NZ	-	5	5	5	5	5	9	2015	106	20,4
ВАПІТІ	N	-	6	5	6	9	6	9	2014	101	19,5
ЖИРАФ	Z	-	5	7	6	7	6	9	2014	97	20,8
ПРЕДАТОР	N	-	5	5	5	7	5	9	2014	103	19
СКОРПІОН	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2014	99	19,6
МАГІСТР	Z/NZ	-	5	7	7	6	6	9	2012	106	21
ТАЛТОС	Z	-	6	7	7	6	6	9	2012	99	21
КОЙОТ	NZ	-	5	7	6	6	6	9	2010	96	20
ФЕДЕРІКА	**NZ**	**-**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**9**	**2009**	**94**	**19**
БАКАРА	**NZ**	**-**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**9**	**2007**	**95**	**18**

*** Потенціал по врожайності коренеплоду т/га** – підтверджена врожайність по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту
**** Потенціал по цукристості %** – підтверджений відсоток цукристості по результатам польових досліджень кваліфікаційної експертизи сорту























Комерційний директор
Горобець Сергій Володимирович,
Тел. (095) 286 70 28
E-mail: Sergiy.Gorobetz@sesvanderhave.com



Директор з виробництва насіння
Гацула Віктор Гаврилович
Тел. (050) 310 44 66
E-mail: Viktor.Gatsula@sesvanderhave.com



Агроном
Дучак Сергій Володимирович
Тел. (050) 444 50 97
E-mail: Sergiy.Duchak@sesvanderhave.com



Технічний консультант
Козій Василь Євгенович, к.с.-г.н.,
Тел. (050) 351 31 41
E-mail: Vasyl.Koziy@sesvanderhave.com



Головний технолог
Марченко Станіслав Іванович, к.с.-г.н.,
Тел. (095) 276 51 85
E-mail: Stanislav.Marchenko@sesvanderhave.com



Завідувач лабораторії якості насіння
Шевченко Костянтин Костянтинович
Тел. (095) 282 04 10
E-mail: Kostyantyn.Shevchenko@sesvanderhave.com

www.sv-ukraine.com.ua



ГЕНЕРАЦІЇ СЕСВАНДЕРХАВЕ

SESVANDERHAVE

ТОВ «Сесвандерхаве-Україна»:
03083, м. Київ,
проспект Науки, 54-Б, офіс 7
Тел./факс (044) 502-93-66, (044) 502-93-67
www.sv-ukraine.com.ua